

5^e ES Complémentation du 4 VI 13 2^h Corrigé succinct

I) Calculer

$$A = 3 \times [30 - (3 + 2 \times 5) + 8 - 4]$$

$$A = 3 [30 - 13 + 8 - 4]$$

$$A = 3 \times 21$$

$$A = 63 \quad (0,5)$$

$$c = 15 - \frac{42}{11 - 2 \times 4}$$

$$c = 15 - \frac{42}{3}$$

$$c = 15 - 14$$

$$c = 1 \quad (0,5)$$

$$B = -(3 - 5 - 1) - (-3 + 7 - 2) - (-1 + 5)$$

$$B = -(-3) - 2 - 4$$

$$B = 3 - 2 - 4$$

$$B = -3 \quad (1)$$

$$D = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{5}{12} + \frac{2}{18}$$

$$D = \frac{10}{18} - \frac{2 \times 5}{3 \times 7 \times 6} + \frac{2}{18}$$

$$D = \frac{10 - 5 + 2}{18}$$

$$D = \frac{7}{18} \quad (1)$$

II) Calculer cette somme

$$E = 32,7 - 18,4 + 17,3 - 56 - 0,6$$

$$E = 32,7 + 17,3 - 18,4 - 0,6 - 56$$

$$E = 50 - 19 - 56$$

$$E = -25 \quad (1)$$

III) Développer et réduire

$$F = 3(3x + 4y + 3) + 4(y - 2x - 3)$$

$$F = 9x + 12y + 9 + 4y - 8x - 12$$

$$F = x + 16y - 3 \quad (0,75)$$

$$G = 8x(x+2) - 5x^2$$

$$G = 8x^2 + 16x - 5x^2$$

$$G = 3x^2 + 16x \quad (0,75)$$

IV) Simplifier

$$H = \frac{72}{84} = \frac{4 \times 18}{4 \times 21} = \frac{18}{21} = \frac{6 \times 3}{7 \times 3} = \frac{6}{7} \quad (0,5)$$

$$I = \frac{108}{126} = \frac{2 \times 2 \times 8 \times 3}{7 \times 9 \times 7} = \frac{6}{7} \quad (0,5)$$

$$\begin{array}{l} \text{Comparer} \\ H = \frac{6}{7} = I \end{array} \quad (0,5)$$

V) Appelons n le nombre de personnes qui passent en 10 min
et y le temps en minutes pour faire passer 75 personnes.

Durée (min)	4	10	y
Nbre de personnes	50	n	75

$$1) n = \frac{50 \times 10}{4} = \frac{1 \times 25 \times 2 \times 5}{1 \times 2} = 125 \quad (1,5)$$

En 10 minutes, il y a donc 125 personnes qui passent.

$$2) y = \frac{4 \times 75}{50} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 25}{7 \times 25} = 6 \quad (1,5)$$

Pour faire passer 75 personnes, il faut 6 minutes.


VI) Calcul d'angles

$$\widehat{DCB} = 50 - 56 = 34^\circ$$


$$\widehat{ECB} = \widehat{DCB} = 34^\circ \quad (2)$$

$$\widehat{EDC} = \widehat{DCB} = 34^\circ \quad (2)$$

$$\widehat{BAC} = \widehat{ABC} = 56^\circ$$



VII)



Hypothèses

EFG est un triangle

EG = 6 cm, $\widehat{FEG} = 55^\circ$, $\widehat{FGE} = 35^\circ$

EFHG est un parallélogramme

I est le milieu de [FG] $\quad (0,5)$

J est le milieu de [FH] $\quad (0,5)$

L est le symétrique de G par rapport à J

K est le symétrique de I par rapport à L

2) Nature de EFG

Dans le triangle EFG on a par (4) $\widehat{FEG} = 55^\circ$ et $\widehat{FGE} = 35^\circ$

dans \widehat{FEG} et \widehat{FGE} sont complémentaires.

or un triangle qui a deux angles complémentaires est rectangle

dans $\triangle EFG$ est un triangle rectangle en F $\quad (1)$

4) Nature de FGHI

Par (4) EFHG est un parallélogramme

or dans un parallélogramme les côtés opposés sont parallèles

dans $(FH) \parallel (EF)$

De plus, d'après 2) $\widehat{EFG} = 90^\circ$ dans $(EF) \perp (FG)$

or si deux droites sont perpendiculaires, l'une est perpendiculaire à l'autre

dans $(FG) \perp (FH)$ donc $\widehat{FGH} = 90^\circ \quad (1,5)$

5) Nature de FGHL

Par (4) J est le milieu de [FH]

et L est le symétrique de G / J donc J est aussi le milieu de [LG]

or un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme

dans $\square FGHL$ est un parallélogramme

De plus, d'après 4) $\widehat{FGH} = 90^\circ$

or un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle

dans $\square FGHL$ est un rectangle $\quad (1,5)$

6) Montrer que (IJ) est une médiatrice de FG

Par (4) I est le milieu de [FG] donc $FI = IG$

dans I appartient à la médiatrice de [FG]

D'après 5) FGHL est un rectangle

or dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur

et se coupent en leur milieu donc $FJ = JG$

dans J appartient à la médiatrice de [FG]

Bilan (IJ) est la médiatrice de [FG] et est donc une

des médiatrices du triangle FJG $\quad (1)$

7) Nature de FGHL

Par (4) I est le milieu de [FG]

et K est le symétrique de J / I donc I est aussi le milieu de [KJ]

or un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur

milieu est un parallélogramme

dans $\square FGKL$ est un parallélogramme

D'après c) (IJ) est la médiatrice de [FG]

or la médiatrice d'un segment coupe ce segment perpendic.

dans : $(IJ) \perp (FG)$ donc $(KJ) \perp (FG)$

or un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires

est un losange

dans $\square FGKL$ est un losange $\quad (1)$

I) Calculer

$$A = 31,7 - 29,4 + 18,3 - 5 - 0,6$$

$$A = 31,7 + 18,3 - 29,4 - 0,6 - 5$$

$$A = 50 - 30 - 5$$

$$A = 20 - 5$$

$$A = 15 \quad (1)$$

$$B = 22,45 - 13,18 - 37,45 + 71,18$$

$$B = 22,45 - 37,45 - 13,18 + 21,18$$

$$B = -15 + 8$$

$$B = -7 \quad (1)$$

II) Calculer avec $x = -4$, $y = -10$ et $z = 3$

$$c = -5 + x - y - (-8) + z$$

$$c = -5 + (-4) - (-10) - (-8) + 3$$

$$c = -5 - 4 + 10 + 8 + 3$$

$$c = -9 + 10 + 11$$

$$c = 12 \quad (1)$$

III) Développer et réduire

$$D = 4(3+x) + 8(x-5)$$

$$D = 12 + 4x + 8x - 40$$

$$D = 4x + 8x + 12 - 40$$

$$D = 12x - 28 \quad (1)$$

$$E = 2(x+4) + 4(y-5)$$

$$E = 2x + 8 + 4y - 20$$

$$E = 2x + 4y - 12 \quad (1)$$

IV) Calculer

$$F = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{6} \right)$$

$$G = \frac{15 - 3x^2 + 6}{3x^5}$$

$$F = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} \times \left(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$G = \frac{15 - 2x + 6}{15}$$

$$F = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{6}{2}$$

$$G = \frac{0}{15}$$

$$F = \frac{2}{3} \quad (1)$$

$$G = 0 \quad (1)$$

V) Vérification d'égalité par $x=2$

$$A = 2x(4x+3)$$

$$B = 4(3x-4)$$

$$A = 2x(4x+3)$$

$$B = 4(3x-4)$$

$$A = 4(8+3)$$

$$B = 4(6-4)$$

$$A = 4 \times 11$$

$$B = 4 \times 2$$

$$A = 44$$

$$B = 8$$

$$A \neq B$$
 dans l'égalité $2x(4x+3) = 4(3x-4)$ faux par $x=2$

VI) 1) Ordalphabète

Appeler n le nombre de jours nécessaires à Ordalphabète pour tailler 72 mètres.

nombre de mètres	12	72
nombre de jours	5	n

$$\text{On remarque que } 72 = 12 \times 6 \\ \text{donc } n = 5 \times 6 = 30 \\ \text{Il lui faudra 30 jours} \quad (1)$$

7) Agacanoujo

Appeler y le nombre de mètres qu'Agacanoujo peut tailler en 75 jours.

nombre de mètres	3	y
nombre de jours	15	75

$$y = 75 \times \frac{3}{15} = \frac{5 \times 7 \times 3}{5 \times 3} = 15$$

Plutôt faire tailler 15 mètres) (2)

3) Obélix

D'après 1), Ordalphabète taille 72 mètres en 30 jours

Par ①, Agacanoujo taille 9 mètres en 15 jours donc
en 2×15 jours, il en taille $2 \times 9 = 18$.

Bilan, en 30 jours :

le nombre de mètres taillés par Ordalphabète et Agacanoujo
est : $72 + 18 = 90$.


le nombre de mètres taillés par Obélix est $240 - 90 = 150$

D'où en un jour :

le nombre de mètres taillés par Obélix est $\frac{150}{30} = \frac{5 \times 30}{30} = 5$

Obélix taille 5 mètres par jour (4)

VII) 1)




2) lecture de coordonnées

D'après le graphique ci-contre,
on a :

$$C(5; 7) \text{ et } D(5; -2) \quad (1)$$

(1)

VIII) 1)



Hypothèses

ABC est un triangle

AB = 4 cm ; BC = 7 cm et $\widehat{BAC} = 55^\circ$

I est le milieu de [AB]

la hauteur de ABC issue de A (1)

la hauteur de ABC issue de C

D est le symétrique de H par rapport à I

$(AB) \parallel (HE)$ et $EE \parallel (BD)$

1) Nature de $ADBH$

Considérons le quadrilatère $ADBH$:

Par ② I est le milieu de [AB]

et D est H sont symétriques par rapport à I

donc I est le milieu de [DH]

or un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme

donc $ADBH$ est un parallélogramme.

de plus, par ④, la hauteur de ABC issue de C coupe (BC) en H
donc \widehat{AHB} est un angle droit.

et un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle
donc $ADBH$ est un rectangle (3)

2) Nature de DH

Par ④ $AB = 4 \text{ cm}$

et d'après 1) $ADBH$ est un rectangle

et dans un rectangle, les diagonales sont de la même longueur.

donc $DH = AB$

donc $DH = 4 \text{ cm}$ (2)

3) Nature de $ABEH$

Par ④ : $(AB) \parallel (HE)$

D'après 1) $ADBH$ est un rectangle
et dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles
donc $(AH) \parallel (BD)$

et par ④ : $E \in (BD)$ donc : $(AH) \parallel (BE)$

Bilan, dans le quadrilatère $ABEH$, on a : $(AB) \parallel (HE)$ et $(AH) \parallel (BE)$
et un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles est un parallélogramme
donc $ABEH$ est un parallélogramme (3)

Calcul de HE

D'après ce qui précède, $ABEH$ est un parallélogramme
et dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de la même mesure
donc $HE = AB$

et par ④ $AB = 4 \text{ cm}$ donc $HE = 4 \text{ cm}$ (2)

Nature de DEH

D'après 2) $DH = 4 \text{ cm}$ et d'après ce qui précède $HE = 4 \text{ cm}$
donc $DH = HE$ donc le triangle DEH est isocèle au H (1)

4) Nature de \widehat{DEH}

Considérons le triangle ABC :

Par ④ $\widehat{BAC} = 55^\circ$ et $H \in (BC)$ donc $\widehat{ABH} = 55^\circ$

D'après 1) \widehat{AHB} est un angle droit donc ABH est rectangle en H
et dans un triangle rectangle les angles aigus sont complémentaires
donc $\widehat{ABH} + \widehat{BAC} = 90^\circ$

donc $\widehat{BAC} = 90^\circ - \widehat{ABH} = 90^\circ - 55^\circ = 35^\circ$

Or d'après 3) $ABEH$ est un parallélogramme

et dans un parallélogramme les angles opposés sont de la même mesure
donc $\widehat{BEH} = \widehat{BAC} = 35^\circ$

et par ④ $E \in (BD)$ donc $\widehat{DEH} = 35^\circ$

Or d'après 3) le triangle DEH est isocèle au H
et dans un triangle isocèle, les angles à la base sont de la même mesure
donc $\widehat{HDE} = \widehat{DEH}$ donc $\widehat{HDE} = 35^\circ$ (4)

I) Calculer

$$A = 3[40 - (3+2x^2) + 10x^2]$$

$$A = 3[40 - (3+10) + 20]$$

$$A = 3[40 - 13 + 20]$$

$$A = 3[27 + 20]$$

$$A = 3 \times 47$$

$$A = 141 \quad (1)$$

$$B = 12 - \frac{41}{7-2x^2}$$

$$B = 12 - \frac{41}{7-4}$$

$$B = 12 - \frac{41}{3}$$

$$B = 12 - 16$$

$$B = -4 \quad (1)$$

$$C = \frac{4}{3} - \frac{3}{3} \times \frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

$$C = \frac{4 \times 4}{3 \times 4} - \frac{3 \times 5}{3 \times 4} + \frac{3 \times 3}{3 \times 4}$$

$$C = \frac{16 - 15 + 9}{12}$$

$$C = \frac{10}{12}$$

$$C = -\frac{5}{3} \quad (1)$$

II) Développer et réduire

$$D = 5(2n+1) + 8(4n-3)$$

$$D = 5 \times 2n + 5 \times 1 + 8 \times 4n - 8 \times 3$$

$$D = 10n + 5 + 32n - 24$$

$$D = 42n - 19 \quad (1)$$

$$E = 5n(n-1) - 4n^2$$

$$E = 5n \times n - 5n \times 1 - 4n^2$$

$$E = 5n^2 - 4n^2 - 5n$$

$$E = n^2 - 5n \quad (1,2)$$

III) Calculer avec $a=12$; $b=-12$; $c=12$; $d=-8$

$$F = a - (b-c) - d$$

$$F = 12 - (-12-12) - (-8)$$

$$F = 12 - (-24) + 8$$

$$F = 12 + 24 + 8$$

$$F = 44 \quad (2)$$

$$G = (a-c) + (b-d)$$

$$G = (12-12) + (-12-(-8))$$

$$G = 0 + (-12+8)$$

$$G = -4 \quad (2)$$

IV) Vérifier l'égalité avec $x = -3,5$ et $y = 1,5$

$$A = x - (x-y)$$

$$A = -3,5 - (-3,5-1,5)$$

$$A = -3,5 - (-5)$$

$$A = -3,5 + 5$$

$$A = 1,5$$

$$B = x + 4y - (y-x)$$

$$B = -3,5 + 4 \times 1,5 - (1,5 - (-3,5))$$

$$B = -3,5 + 6 - (-1,5 + 3,5)$$

$$B = -3,5 + 6 - 5$$

$$B = -2,5$$

On constate donc que $A \neq B$

donc l'égalité n'est pas vérifiée avec $x = -3,5$ et $y = 1,5$

$$(3)$$

V) Calculer astucieusement

$$H = -283 + 654 - 117 + 842 - 754 + 458$$

$$H = -283 - 117 + 654 - 754 + 842 + 458$$

$$H = -400 - 100 + 1300$$

$$H = 800 \quad (1,5)$$

$$I = 29,45 - 52,17 + 13,08 - 71,45 + 31,92 - 15,83$$

$$I = 29,45 - 71,45 - 52,17 - 15,83 + 13,08 + 31,92$$

$$I = -42 - 68 + 52$$

$$I = -110 + 51$$

$$I = -59 \quad (1,5)$$

VI) Fraction de la plaque mangée par Nicolas à la réunions des maths : $\frac{3}{8}$

Part de cette fraction mangée par Nicolas : $\frac{3}{3} - \frac{3}{3} = \frac{1}{3}$


Fraction de la plaque mangée par Nicolas le matin : $\frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{8}$

Fraction de la plaque restant à midi : $\frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

Fraction de la plaque mangée par chacun des 5 enfants : $\frac{1}{5} \times \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$

Fraction de la plaque mangée en tout par Nicolas : $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

Nicolas a donc mangé en tout 6 quart de la plaque de chocolat. (4)



Hypothèse

LOIC est un rectangle

LO = 5cm ; OI = 3cm

(O) // (LF) et FE(OI)

$$(1)$$

E et C sont symétriques par rapport à I
et O

1) Nature de CLFO

Par (1) LOIC est un rectangle
a un rectangle a ses côtés
opposés parallèles
donc (OI) // (CL)

a par (1) FE(OI) donc (OF) // (FC)

De plus par (1) (O) // (LF)

Bilan, donc le quatuor bâti

CLFO, on a : (OF) // (CL) et (OI) // (LF)

on un quadrilatère dont les côtés
opposés sont parallèles et un parallélogramme.

donc CLFO est un parallélogramme. (2)

2) Longueur de [OF]

Par (1) LOIC est un rectangle
a dans un rectangle les côtés
opposés sont de même longueur
donc CL = OI

Ainsi, CLFO est un parallélogramme

de plus d'après 1) OI = 3cm

on le droit qui coupe un segment
perpendiculairement en son milieu
est sa médiane

Donc OF = 3cm. (2)

3) Position de O

D'après 2) OF = OI

et par (1) FE(OI)

donc O est le milieu de [IF]. (2)

4) Que représente (OI) par rapport à [IF] ?

Par (1) LOIC est un rectangle

donc (OL) ⊥ (CI)

donc (OR) ⊥ (CE)

de plus d'après 3) O est le milieu de [IF]

on le droit qui coupe un segment

perpendiculairement en son milieu
est sa médiane

Donc OI est la médiane de [IF]. (2)

6) Nature de OCRE

Par (1), E et C sont symétriques par rapport à I

et O et R

donc le quadrilatère OLRE a I comme

centre de symétrie

ou un quadrilatère qui a un centre de symétrie

et un parallélogramme

donc OLRE est un parallélogramme. (2)

De plus par (1) LOIC est un rectangle

donc (OI) ⊥ (CI)

donc (OR) ⊥ (CE)

donc les diagonales de OCRE sont perpendiculaires

ou un parallélogramme dont les diagonales sont

perpendiculaires est un losange

donc OCRE est un losange. (2)

VII)

Hypothèses

AUX est un triangle

$\widehat{XAU} = 50^\circ$

$\widehat{AXU} = 90^\circ$

OUM est rectangle en O

O.U // A.U

$\widehat{OUM} = \widehat{AUX}$

MUR est isocèle en M

$\widehat{MUR} = 73^\circ$

(1,5)

Calcul de \widehat{AUX} puis \widehat{OUM}

Dans le triangle AUX, on a par (1) : $\widehat{XAU} = 50^\circ$ et $\widehat{AXU} = 90^\circ$

or la somme des angles d'un triangle est égale à 180°

donc $\widehat{AUX} + \widehat{XAU} + \widehat{AXU} = 180^\circ$ donc $\widehat{AUX} + 50 + 90 = 180$ donc $\widehat{AUX} = 30^\circ$

et par (1) $\widehat{OUM} = \widehat{AUX}$ donc $\widehat{OUM} = 30^\circ$ (2)

Calcul de \widehat{OUM} puis \widehat{UMR}

Par (1) le triangle MUR est isocèle en M avec $\widehat{RMU} = 73^\circ$

or dans un triangle isocèle les angles au sommet sont de même mesure donc $\widehat{MRU} = 73^\circ$

et comme la somme des angles est égale à 180° , on a :

$\widehat{MRU} + \widehat{RMU} + \widehat{RUM} = 180^\circ$ donc $73 + 73 + \widehat{RUM} = 180$ donc $\widehat{RUM} = 34^\circ$ (2)

Bilan : les angles \widehat{OUM} et \widehat{UMR} sont formés par les droites (OU), (UR) et la

sécante (MU). Ces deux angles sont donc alternes-internes.

or deux droites formées avec une sécante de angles alternes-internes égaux sont parallèles

donc : (OU) // (UR) donc (AU) // (UR) (2)

I) Calculer

$$A = -0,75 + 0,27 - 0,25 + 0,13 - 0,7$$

$$A = -0,75 - 0,25 + 0,27 + 0,13 - 0,7$$

$$A = -1 + 0,14 - 0,7$$

$$A = -0,6 - 0,7$$

$$A = -1,3 \quad \text{①,5}$$

$$B = -2 - (4-6) - (-8+10)$$

$$B = -2 - (-2) - 2$$

$$B = -2 + 2 - 2$$

$$B = -2 \quad \text{①,5}$$

$$C = 2 - (0,2-2) + (-2+2,2)$$

$$C = 2 - (-1,8) + 0,2$$

$$C = 2 + 1,8 + 0,2$$

$$C = 2 + 2$$

$$C = 4 \quad \text{①,5}$$

II) Calculer

$$D = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{7}{3}$$

$$D = \frac{15}{18} + \frac{7}{18}$$

$$D = \frac{22}{18}$$

$$D = \frac{2 \times 11}{2 \times 9}$$

$$D = \frac{11}{9} \quad \text{①,5}$$

$$E = \frac{3}{2} \times \frac{6}{25} - \frac{3}{5} \times \frac{4}{5}$$

$$E = \frac{3 \times 2 \times 2}{2 \times 25} - \frac{3 \times 4}{25}$$

$$E = \frac{14}{25} - \frac{12}{25}$$

$$E = \frac{2}{25} \quad \text{①,5}$$

$$F = \left(4 + \frac{2}{3}\right) \times \left(2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$F = \left(\frac{12}{3} + \frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{4}{2} - \frac{1}{2}\right)$$

$$F = \frac{14}{3} \times \frac{3}{2}$$

$$F = \frac{2 \times 7 \times 3}{3 \times 2}$$

$$F = 7 \quad \text{①,5}$$

III) Calculer pour $a = -1,5$; $b = 4,6$; $c = -7,8$

$$G = a - b - c$$

$$G = -1,5 - 4,6 - (-7,8)$$

$$G = -6,1 + 7,8$$

$$G = 1,7 \quad \text{①,5}$$

$$H = (a-c) - (a-b)$$

$$H = [-1,5 - (-7,8)] - [-1,5 - 4,6]$$

$$H = (-1,5 + 2,8) - (-6,1)$$

$$H = 6,3 + 6,1$$

$$H = 12,4 \quad \text{①,5}$$

$$I = b - (a+c) - (b-c)$$

$$I = 4,6 - (-1,5 - 7,8) - (4,6 - (-7,8))$$

$$I = 4,6 - (-9,3) - (4,6 + 7,8)$$

$$I = 4,6 + 9,3 - 12,4$$

$$I = 13,9 - 12,4$$

$$I = 1,5 \quad \text{①,5}$$

IV) 1) Développer et réduire

$$J = 5(8n-3) + 4(3-n)$$

$$J = 5 \times 8n - 5 \times 3 + 4 \times 3 - 4 \times n$$

$$J = 40n - 15 + 12 - 4n$$

$$J = 36n - 3 \quad \text{①,5}$$

$$2) Calculer avec $n = \frac{1}{2}$$$

$$J = 36n - 3 \quad \text{d'après 1)}$$

$$J = \frac{36}{2} - 3$$

$$J = 18 - 3$$

$$J = 15 \quad \text{①,5}$$

3) Factoriser

$$K = 10ab - 5b$$

$$L = 5b \times 2a - 5b \times 1$$

$$K = 5b(2a-1) \quad \text{①,5}$$

V) 1) Proportion des passagers qui ne sont pas français

$$\text{Fraction de passagers français : } \frac{12}{13} \times \frac{3}{4} = \frac{3 \times 4 \times 3}{13 \times 4} = \frac{9}{13}$$

$$\text{Fraction des passagers qui ne sont pas français : } \frac{13}{13} - \frac{9}{13} = \frac{4}{13}$$


les quatre quatrièmes des passagers ne sont pas français

2) Nombre de passagers qui ne sont pas français

$$\text{Le nombre de passagers cherché est : } \frac{4}{13} \times 260 = \frac{4 \times 13 \times 20}{13} = 4 \times 20 = 80$$

Il y a 80 passagers qui ne sont pas français

III)



Hypothèses

ABC est un parallélogramme

AD = 8,2 cm ; AB = $\frac{1}{2}$ AD

$\widehat{BAD} = 120^\circ$

J appartient à la bissectrice de \widehat{BAD}

J appartient à la bissectrice de \widehat{ABC} ②

K ∈ (AJ) ; K ∈ (BC)

BJKL est un parallélogramme

2) Démontrer $\widehat{ABC} = 60^\circ$

Par ① ABCD est un parallélogramme

→ dans un parallélogramme, deux angles consécutifs sont supplémentaires

donc $\widehat{BAD} + \widehat{ABC} = 180^\circ$

or par ④ $\widehat{BAD} = 120^\circ$ donc $120 + \widehat{ABC} = 180$ donc $\widehat{ABC} = 180 - 120$ donc $\widehat{ABC} = 60^\circ$ ③

3) ② Calculer \widehat{BAJ}

Par ④ $\widehat{ABC} = 60^\circ$ et J appartient à la bissectrice de \widehat{BAD} donc $\widehat{BAJ} = \frac{\widehat{BAD}}{2} = \frac{120}{2} = 60^\circ$ ②

Calculer \widehat{ABJ}

D'après 2) $\widehat{ABC} = 60^\circ$ et par ④ J appartient à la bissectrice de \widehat{ABC} donc $\widehat{ABJ} = \frac{\widehat{ABC}}{2} = \frac{60}{2} = 30^\circ$ ②

⑤ Nature de \widehat{ABJ}

Considérons le tri angle ABJ.

D'après ④, $\widehat{BAJ} + \widehat{ABJ} = 60 + 30 = 90^\circ$ donc \widehat{BAJ} et \widehat{ABJ} sont complémentaires.

→ un triangle qui a deux angles complémentaires est un triangle rectangle

donc $\boxed{\text{le triangle ABJ est rectangle en J}}$ ③

⑥ Nature de \widehat{AKB}

Considérons le tri angle AKB.

D'après 2) $\widehat{ABC} = 60^\circ$ et par ④ K ∈ (BC) donc $\widehat{AKB} = 60^\circ$

D'après ④ $\widehat{BAJ} = 60^\circ$ et par ④ K ∈ (AJ) donc $\widehat{BAK} = 60^\circ$

→ la somme des angles d'un tri angle est égale à 180°

donc $\widehat{AKB} + \widehat{BAK} + \widehat{BAJ} = 180^\circ$

donc $60 + 60 + \widehat{AKB} = 180^\circ$

donc $\widehat{AKB} = 60^\circ$

→ le tri angle AKB a ses 3 angles égaux à 60°

donc $\boxed{\text{le tri angle AKB est équilatéral}}$ ③

⑦ Nature de \widehat{BJKL}

Par ④ BJKL est un parallélogramme

D'après ④ le tri angle AJB est rectangle en J donc $\widehat{AJB} = 90^\circ$ et comme par ④ K ∈ (AJ) donc $\widehat{KJB} = 90^\circ$

→ un parallélogramme avec un angle droit est un rectangle

donc $\boxed{\text{BJKL est un rectangle}}$ ③

II) Calculer

$$A = [6 - (0,25 \times 4 + 2)] \times 9$$

$$A = [6 - (1+2)] \times 9$$

$$A = (6-3) \times 9$$

$$A = 3 \times 9$$

$$A = 27$$

$$B = 3 \times [14,5 - (0,4 \times 5 + 0,5 \times 3)]$$

$$B = 3 \times [14,5 - (2+2,5)]$$

$$B = 3 \times (14,5 - 4,5)$$

$$B = 3 \times 10$$

$$B = 30$$

$$C = (34-13) \times [3,4 - (1,2 + 1,3)]$$

$$C = 21 \times (3,4 - 2,5)$$

$$C = 21 \times 0$$

$$C = 0$$

$$\text{④}$$

$$D = \frac{13,5 - (2+1) \times 2,5}{(1+2) \times 3 + 3 \times (5-1)}$$

$$D = \frac{13,5 - 3 \times 2,5}{(1+2) \times 3 + 3 \times 3}$$

$$D = \frac{13,5 - 7,5}{9 + 9}$$

$$D = \frac{12}{18} ; D = \frac{2}{3}$$

$$\text{⑤}$$

$$\text{I) Ecrire } E \text{ sous forme mathématique : } E = 4x\left(3x + \frac{7}{4}\right) \text{ ⑥}$$

$$\text{2) Développer } E : E = 4x\left(3x + \frac{7}{4}\right) = 4x \cdot 3x + 4x \cdot \frac{7}{4} = 12x^2 + 7x \text{ ⑦}$$

$$\text{3) Calculer } E \text{ quand } x = \frac{1}{2} : \text{ si } x = \frac{1}{2} \text{ alors d'après 2), } E = 12 \cdot \frac{1}{2}^2 + 7 = 6 + 7 = 13 \text{ ⑧}$$

III) Calculer

$$F = \frac{3}{8} \times \frac{4}{3} - \frac{3}{8} \times \frac{1}{3}$$

$$F = \frac{3 \times 1}{8 \times 3} - \frac{3 \times 2}{8 \times 3}$$

$$F = \frac{1}{8} - \frac{1}{4}$$

$$F = \frac{1}{16} \quad \text{⑨}$$

$$F = \frac{1}{16} \quad \text{⑩}$$

IV) Calculer

$$G = \frac{11}{12} - \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{6}\right)$$

$$G = \frac{11}{12} - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{6} + \frac{5}{6}\right)$$

$$G = \frac{11}{12} - \frac{1}{2} \times \frac{7}{6}$$

$$G = \frac{11}{12} - \frac{35}{12}$$

$$G = \frac{1}{12} \quad \text{⑪}$$

$$H = -12,5 + 24 + (-19,3) + (-1,7) + 0,5 \quad \text{⑫}$$

$$H = (-12,5) + 0,5 + 24 + (-19,3) + (-1,7) \quad \text{⑬}$$

$$H = -12 + 24 - 21 \quad \text{⑭}$$


$$H = -12 - 21 \quad \text{⑮}$$

$$I = 7,8 + (-3,2) + 15 + (-1,2) + (-13) + 0,5 \quad \text{⑯}$$

$$I = 7,8 + (-7,8) + (-3,2) + (-13) + 15 + 0,5 \quad \text{⑰}$$

$$I = 0 - 5 + 2 \quad \text{⑱}$$

$$I = -3 \quad \text{⑲}$$



Hypothèse : le triangle ABD est rectangle en A

$$AB = 7 \text{ cm}$$

$$\widehat{ABD} = 45^\circ \quad \text{⑳}$$

O est le milieu de [BD]

C est le symétrique de A par rapport à O

E est le milieu de [AB]

F est le symétrique de D par rapport à E

 I) Angle \widehat{ADB}

Par ⑩ ABD est un triangle rectangle en A

or dans un triangle rectangle les angles auxiliaires sont complémentaires

$$\text{dans } \widehat{ABD} + \widehat{ADB} = 90^\circ$$

$$\text{or par ⑩ } \widehat{ABD} = 45^\circ$$

$$\text{dans } \widehat{ABD} + 45 = 90 \quad \text{dans } \widehat{ADB} = 45^\circ \quad \text{㉑}$$

II) Longueur AD

considérons le triangle ABD : d'après ⑩ $\widehat{ABD} = 45^\circ$ et par ⑩ $\widehat{ABD} = 45^\circ$

or un triangle ayant deux angles de même mesure est isocèle

donc le triangle ABD est isocèle en A

$$\text{donc } AD = AB$$

$$\text{or par ⑩ } AB = 7 \text{ cm donc } AD = 7 \text{ cm} \quad \text{㉒}$$

 2) Nature de $\triangle BCD$

considérons le quadrilatère ABCD de diagonales [AC] et [BD]

Par ⑩ C est le symétrique de A par rapport à O donc O est le milieu de [AC]

Par ⑩ D est le milieu de [BD]

or un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme donc ABCD est un parallélogramme.

De plus ⑩ $AO = BO$

or un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont de même longueur est un losange donc ABCD est un losange

De plus par ⑩ \widehat{BAD} est un angle droit

or un losange avec un angle droit est un carré donc ABCD est un carré ③

3) Périmètre et aire de ABCD

D'après ⑩ ABCD est un carré donc son périmètre est $P = 4 \times AB = 4 \times 7 = 28 \text{ cm} \quad \text{㉔}$

et son aire est $A = AB \times AD = 7 \times 7 = 49 \text{ cm}^2 \quad \text{㉕}$

3) Nature de AFBD

considérons le quadrilatère AFBD de diagonales [AB] et [FD]

Par ⑩ E est le milieu de [AB]

Par ⑩ F est le symétrique de D par rapport à E donc E est le milieu de [FD]

or un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme donc AFBD est un parallélogramme ②

 4) Angle \widehat{BAF}

D'après ⑩ AFBD est un parallélogramme

or dans un parallélogramme les côtés opposés sont parallèles

$$\text{dans } [BD] \parallel [AF]$$



De plus (AB) est sécant à ces deux droites donc les angles \widehat{BAF} et \widehat{ABD} sont alternes-internes

ou une sécante formée avec deux parallèles des angles alternes-internes de même mesure

$$\text{dans } \widehat{BAF} = \widehat{ABD}$$

$$\text{or par ⑩ } \widehat{ABD} = 45^\circ \quad \text{dans } \widehat{BAF} = 45^\circ \quad \text{㉖}$$

IV)



Coordonnées des points :

- R(1,2;2)
- S(1,-2)
- A(-1,2;2)
- B(1,2;-2)
- C(3,2;-2)
- D(1,2;-6)

I) 1) Pourcentage d'élèves ayant en la moyenne

Appeler $\frac{n}{100}$ ce pourcentage.

Nombre d'élèves ayant en la moyenne	15	n
Nombre total d'élèves	24	100

$$n = \frac{15 \times 100}{24} = \frac{15 \times 10 \times 10}{24 \times 10 \times 2} = \frac{125}{2} = 62,5$$

Donc $62,5\%$ des élèves de la classe ont en la moyenne $\boxed{2,5}$

2) Nombre d'élèves ayant en plus de 16

Appeler y ce nombre.

Nombre d'élèves ayant en plus de 16	20	y
Nombre d'élèves ayant en la moyenne	100	15

On remarque que $20 = 100 : 5$ donc $y = 15 : 5 = 3$

Il y a donc $\boxed{3}$ élèves qui ont en plus de 16 $\boxed{2,5}$

II) 1) Temps qu'il faut à Nail pour traverser la route

Appeler x ce temps en secondes.

Largeur de la route (m)	18 000	15
Temps nécessaire pour la traverser (s)	3600	x

On remarque que $3600 = 18000 \times \frac{2}{10}$ donc $x = \frac{15 \times 2}{10} = \frac{30 \times 2}{20} = 3$

Nail traverse donc la route en 3 s $\boxed{2}$

2) Distance parcourue par une voiture réalisant $\frac{3}{7,5}$ km/h

Appeler y cette distance en m.


Distance parcourue par la voiture (m)	90 000	y
Temps (s)	3600	3

On remarque que $3 = 3600 : 1200$ donc $y = \frac{90000}{1200} = \frac{8 \times 10^4 \times 6 \times 75}{8 \times 10^3 \times 120} = 75$

En 3 s la voiture parcourt 75 m $\boxed{2}$

3) Nail est-il en danger ?

Oui ! Nail n'a que 60 m de visibilité et pendant sa traversée, une voiture a le temps d'arriver 75 ! $\boxed{1}$



Hypothèse

ABC est un parallélogramme

la bissectrice de BAD coupe (DC) en E
FE || (AB) et AF = AD $\boxed{1}$

1) Montrer que $\widehat{FAE} = \widehat{AED}$

Par $\boxed{1}$ ABC est un parallélogramme

or dans un parallélogramme les côtés opposés sont parallèles
donc (AD) est parallèle à (BC)

or par $\boxed{1}$ $F \in (AB)$ et $E \in (CD)$

donc (AF) est parallèle à (DE)

or (AE) est sécante à (AF) et (DE)

donc les angles \widehat{FAE} et \widehat{AED} sont alternes-internes

or une réciproque avec des parallèles des angles alternes-internes de même mesure
donc $\widehat{FAE} = \widehat{AED}$ $\boxed{3}$

2) Montrer que $AD = DE$

Par $\boxed{1}$ (AE) est la bissectrice de BAD et donc $\widehat{FAD} = \widehat{EAD}$

donc $\widehat{FAE} = \widehat{AED}$

Or d'après $\boxed{1}$ $\widehat{FAE} = \widehat{AED}$ donc dans le triangle AED, on a : $\widehat{AED} = \widehat{EAD}$

Or si un triangle a deux angles de même mesure alors il est isocèle

donc le triangle AED est isocèle en D

donc $\boxed{AD = DE}$ $\boxed{2}$

3) Nature de ADEF

montrons que la quadrilatère ADEF :

D'après $\boxed{2}$ $AD = DE$ et par $\boxed{1}$ $AD = AF$ donc $DE = AF$

De plus d'après $\boxed{1}$ (DE) est parallèle à (AF)

Or si un quadrilatère a deux côtés parallèles et de même longueur alors il est un parallélogramme.

Donc ADEF est un parallélogramme

De plus d'après ce que précise, $AD = DE$

or un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange

Donc $\boxed{ADEF est un losange}$ $\boxed{3}$

I) Calculer

$$A = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \times \frac{1}{5} + 24 \times \frac{1}{30}$$

$$A = \frac{3}{2} - \frac{3}{10} + \frac{24}{30}$$

$$A = \frac{3 \times 5}{2 \times 5} - \frac{3}{10} + \frac{8 \times 3}{10 \times 3}$$

$$A = \frac{15}{10} - \frac{3}{10} + \frac{8}{10}$$

$$A = \frac{15-3+8}{10}$$

$$A = \frac{20}{10}$$

$$A = 2 \quad \text{②}$$

$$B = \left(\frac{13}{21} + \frac{2}{7} \right) \times \left(\frac{3}{5} + \frac{3}{10} \right)$$

$$B = \left(\frac{13}{21} + \frac{2 \times 3}{7 \times 2} \right) \times \left(\frac{3 \times 2}{5 \times 2} + \frac{3}{10} \right)$$

$$B = \left(\frac{13}{21} + \frac{6}{14} \right) \times \left(\frac{6}{10} + \frac{3}{10} \right)$$

$$B = \frac{11}{21} \times \frac{15}{10}$$

$$B = \frac{11 \times 15}{2 \times 3 \times 5 \times 2}$$

$$B = \frac{11}{2 \times 2}$$

$$B = \frac{11}{14} \quad \text{②}$$

$$C = 25 + 100 : 5 - 6 \times 15$$

$$C = 25 + 20 - 90$$

$$C = 45 - 90$$

$$C = -45 \quad \text{②}$$

$$D = 23 \times 4$$

$$D = 92 \quad \text{②}$$

$$D = [18 - (2-7)] \times 4$$

$$D = [18 - (-5)] \times 4$$

$$D = [18 + 5] \times 4$$

$$D = 23 \times 4$$

$$D = 92 \quad \text{②}$$

II) Calculer $a = -7 \quad b = -4 \quad c = 3 \quad d = 1$

$$E = a - (b - c) - (a + d)$$

$$E = -7 - (-4 - 3) - (-7 + 1)$$

$$E = -7 - (-7) - (-6)$$

$$E = -7 + 7 + 6$$

$$E = 6 \quad \text{②}$$

$$F = a - b + c - d$$

$$F = -7 - (-4) + 3 - 1$$

$$F = -7 + 4 + 3 - 1$$

$$F = -3 + 3 - 1$$

$$F = -1 \quad \text{②}$$

III) Envier pour effectuer le calcul

$$1) \boxed{G = \frac{6}{5} + \frac{3}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5} + \frac{21}{10} = \frac{8}{10} + \frac{21}{10} = \frac{29}{10}} \quad \text{②}$$

$$2) \boxed{H = 18 \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) = 18 \times \left(\frac{2}{8} + \frac{1}{8} \right) = 18 \times \frac{3}{8} = \frac{1 \times 3 \times 3}{2 \times 4} = \frac{27}{8}} \quad \text{②}$$

II 1) Développer et réduire :

$$I = 2(3n+4) + 3(2n-3)$$

$$I = 2 \times 3n + 2 \times 4 + 3 \times 2n - 3 \times 3$$

$$I = 6n + 8 + 6n - 9$$

$$\boxed{I = 12n - 1} \quad \text{②}$$

2) Calculer I quand $n = \frac{3}{4}$

$$I = 12n - 1$$


$$I = 12 \times \frac{3}{4} - 1$$

$$I = \frac{3 \times 4 \times 3}{4} - 1$$

$$I = 9 - 1$$

$$\boxed{I = 8} \quad \text{②}$$

I) Construction LOUP



II) 1) Hypothèses

FHE est un triangle rectangle en H

$\widehat{HE} = 90^\circ$


$\widehat{HEF} = 32^\circ$

N est le milieu de [FE]

(NC) \perp (FH) et C \in [FH]

R est le symétrique de C par rapport à N

①

Calcul de \widehat{HFE}

Par ① le triangle FHE est rectangle en H donc $\widehat{FHE} = 90^\circ$

de plus par ② $\widehat{HEF} = 32^\circ$

De la somme des angles d'un triangle est de 180°

donc $\widehat{HFE} + \widehat{FHE} + \widehat{HEF} = 180^\circ$

donc $\widehat{HFE} + 90 + 32 = 180$

donc $\widehat{HFE} + 112 = 180$

donc $\widehat{HFE} = 180 - 112$

donc $\widehat{HFE} = 58^\circ$ ⑤

2) ② Nature de CERF

Dans le quadrilatère CERF, on a :

Par ④ R est le symétrique de C par rapport à N

Donc N est le milieu de [CR]

De plus par ③, N est le milieu de [FE]

De un quadrilatère dont les diagonales se

coupent en leur milieu et un parallélogramme

donc CERF est un parallélogramme ③

③ Nature que : (CP) \parallel (HF)

Par ④ FHE est rectangle en H donc : (HE) \perp (FH)

De plus par ④ : (FH) \perp (NC)

or ces deux droites sont perpendiculaires à une même

3^{es} alors elles sont parallèles entre elles

donc : (HE) \parallel (NC)

donc : (HF) \parallel (CE) ⑤

④ Nature de ENR

(NE) coupe (NR) et (HE) respectivement en N et E donc ENR est \widehat{NEN} sont alternes intérieures.

et comme d'après ④ (CP) et parallèle à (HE), on a donc (NE) et (HE) qui sont parallèles

or deux droites parallèles forment avec une sécante les angles alternes intérieurs de même mesure

donc : ENR \sim NEN donc : ENR = \widehat{NEN}

et comme par ④, $\widehat{HEF} = 32^\circ$, on a $\widehat{ENR} = 32^\circ$ ③

3) Nature de CHER

d'après ② CERF est un parallélogramme

ou un parallélogramme à ses côtés opposés égaux

donc CHER est un parallélogramme

De plus d'après ④ : (HE) \parallel (CE)

De plus d'après ④ : (HE) \parallel (CR)

Donc dans le quadrilatère CHER, on a :

(RE) \parallel (CH) et (HE) \parallel (RC)

en un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles

est un parallélogramme

donc CHER est un parallélogramme

De plus d'après ④ : $\widehat{FHE} = 90^\circ$ donc : $\widehat{CHE} = 90^\circ$

De un parallélogramme qui a un angle droit

est un rectangle

donc CHER est un rectangle ③